

TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) DES ANGINES A STREPTOCOQUE DU GROUPE A PAR LE PHARMACIEN D'OFFICINE

Publics : pharmaciens

Pré-requis : pharmaciens diplômés d'état

Durée : 4 heures 30

Délai d'accès : le professionnel de santé pourra s'inscrire jusqu'au soir du 1er jour de la session et se désinscrire jusqu'à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour les salariés, afin d'établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr

Tarif : 399 € TTC / personne

Accès handicapé : différent selon le lieu de la formation, pour tout renseignement nous contacter à c.courrouy@maformationsante.fr

Prise en charge par le FIFPL, par l'OPCO

Méthodes mobilisées : présentation power point, échanges, cas pratiques, questions, apports théoriques, échanges en collectif, étude de cas concrets

Modalités d'évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction

Intervenante : Dr Patricia Martel, médecin généraliste, journaliste médical

Les objectifs pédagogiques de la session sont :

- Savoir repérer les situations à risque d'angine streptococcique, notamment grâce au score de Mac Isaac
- Appliquer le protocole déterminé pour l'utilisation ou non du Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD)
- Savoir réaliser un prélèvement pharyngé efficace et bien toléré
- Savoir orienter la prise en charge du patient en fonction des résultats du test
- Réaliser un conseil pharmaceutique pertinent et personnalisé lorsque la délivrance d'antibiotiques n'est pas souhaitable, pour cause de test négatif ou de situation à faible risque d'angine streptococcique, et communiquer efficacement dans ce cadre pour une bonne adhésion du patient à la décision thérapeutique

TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) DES ANGINES A STREPTOCOQUE DU GROUPE A PAR LE PHARMACIEN D'OFFICINE

Programme détaillé :

I Apports théoriques 2H

1. Introduction – Tour de table
2. Contexte réglementaire
3. Communication, traçabilité
4. Les situations à risque d'angine streptococcique
5. Protocole pour utiliser ou non un TROD
6. Le prélèvement pharyngé
7. Orientation du patient en fonction des résultats du tests
8. Le conseil pharmaceutique lorsque la délivrance d'antibiotiques n'est pas indiquée
9. Une communication efficace pour la bonne adhésion du patient

Méthode : diaporama, vidéo

Objectifs :

- Savoir repérer les situations à risque d'angine streptococcique, notamment grâce au score de Mac Isaac
- Appliquer le protocole déterminé pour l'utilisation ou non du Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD)
- Orienter la prise en charge du patient en fonction des résultats du test
- Réaliser un conseil pharmaceutique pertinent et personnalisé lorsque la délivrance d'antibiotiques n'est pas souhaitable, pour cause de test négatif ou de situation à faible risque d'angine streptococcique, et communiquer efficacement dans ce cadre pour une bonne adhésion du patient à la décision thérapeutique

III Réalisation du test de prélèvement pharyngé en situation réelle 2H

Méthode : Démonstration et exercice pratique en groupe

Objectif :

- Savoir réaliser un prélèvement pharyngé efficace et bien toléré

Evaluation post - formation : cas pratique 20 min

Conclusion 10 min